

سويتش

62.5% ديليو جي

وداعا لأعفان الثمار
فعالية مزدوجة لحماية مستمرة



المادة الفعالة :-

فلوديوكسونيل 250 جم/كجم ديليو جي (Fludioxonil 250 g/kg WG)
سايبيرودينيل 375 جم/كجم ديليو جي (Cyprodinil 375 g/kg WG)

الوصف :-

يتركب المبيد من مادتين فعاليتين كل مادة تختلف عن الأخرى في طريقة عملها مما يؤدي الي مكافحة مجموعة كبيرة من الامراض وتحسين فعالية المبيد والوقاية من حدوث المناعة . حيث يستخدم في علاج أعفان الثمار بمحاصيل الفاكهة و الخضر

صور الاصابات علي المحاصيل المختلفة



عفن البوتريتس في الطماطم



عفن البوتريتس في الفراولة



عفن البوتريتس في العنب



البوتريتس وجلوميرالا في العنب



عفن البوتريتس في الخس



عفن البوتريتس في الخيار



عفن البوتريتس في الفلفل



عفن البوتريتس في الطماطم



البوتريتس في ساق الطماطم

طريقة الاستخدام والجرعات :-

المحصول	المرض	معدل الاستخدام لتر/هكتار	ميعاد المعاملة	فترة الامان
العنب	Botrytis cinerea, Glomerella cingulata,	1200-600 جم/ هكتار	عند الإزهار / عند تفتح البراعم / عند بداية التلوين / ما قبل الحصاد	35 يوم
الفراولة	Botrytis cinerea	1200-800 جم/ هكتار	قبل التزهير / بعد التزهير / قبل الحصاد	3 يوم
الباذنجان		1000-600 جم/ هكتار		14 يوم
الطماطم		1000-800 جم/ هكتار		7 يوم
القرعيات		1000-600 جم/ هكتار	عند ظهور الاعراض الاولية للاصابة	7 يوم
الخس		Botrytis cinerea , Sclerotinia	1000-600 جم/ هكتار	
البازلاء والفاصوليا	Botrytis cinerea Ascochyta pisi Sclerotinia	1000-800 جم/ هكتار		14 يوم
الكمثري	Stemphylium spp	800-600 جم/ هكتار	من بداية الازهار وحتى قبل الحصاد	14 يوم
الفواكة ذات النواة الحجرية	Monilinia spp (Flower/ Twig blight) Monilinia spp (Brown rot)	450-300 جم/ هكتار	اثناء الازهار وقبل الحصاد	14 يوم
نباتات الزينة	Botrytis cinerea	1000-600 جم/ هكتار	عند ظهور الاعراض الاولية للاصابة	-

العبوات :

سويتش متاح في عبوة سعة 250 جم