

syngenta

سويسرا

البياسين الزراعية  
ALYASEEN AGRI



بوكسر

80% اي سي

المكافحة الأكيدة للحشائش الحولية  
الرفيعة وبعض عريضة الاوراق



المادة الفعالة :-

بروسلفوكارب بكمية 80% إي سي ( Prosulfocarb 80% EC )

الوصف :-

مبيد حشائش اختياري، يستخدم قبل الانبات لمكافحة بعض الاعشاب رفيعة وعريضة الاوراق في القمح والشعير

## مميزات استخدام بوكسر :-

يكافح العديد من أنواع الحشائش الضارة . لا يوجد قيوداً على استخدام المنطقة المزروعة للموسم التالي ، أي أنه لا يؤثر على تناوب المحاصيل

## توصيات الاستخدام :-

- 1- يجب تجنب الزراعة السطحية للبذور بحيث لا يقل عمق الزراعة عن 2.5- 3 سم للتربة الرملية و 2 سم للتربة الطينية.
- 2- يستخدم المبيد بعد الزراعة وقبل إنبات . بعد الريّة الاولى أو الثانية . على أن تكون التربة بها رطوبة، وينتظر مدة 24 ساعة بعد المعاملة وقبل البدء بالريّة الثانية
- 3- أكبر فعالية للتأثير هو ميعاد الاستخدام الموصى به ، اما في المراحل اللاحقة ، يكون الاستخدام أقل فعالية أو عديم الفائدة بشكل عام .
- 4- يجب مراعاة درجة رطوبة التربة عند المعاملة بحيث لا تزيد عن 50 % من السعة الحقلية .
- 5- ان الموعد الأمثل لاستخدام بوكسر هو في مرحلة قبل الانبات وظهور البادرات فوق سطح التربة، وذلك لتجنب حدوث أي ضرر لبادرات القمح، ولكن يمكن استخدام بوكسر في مرحلة مبكرة من الانبات وظهور البادرات فوق سطح التربة مع ملاحظة امكانية حدوث توقف في نمو وتطور تلك البادرات لمدة 7-14 يوم. وذلك حسب الظروف الجوية المحيطة، مع العلم أن هذه البادرات تستعيد نشاطها لاحقاً لتستكمل نموها بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم.
- 6- في حالة وجود اصابة عالية بالاعشاب عريضة الاوراق ينصح باستخدام مبيد آخر لمكافحة الاعشاب العريضة في مرحلة لاحقة من استخدام المبيد بوكسر لضمان المكافحة المثلى لتلك الاعشاب .
- 7- كأى مبيد أعشاب آخر يجب مراعاة عند استخدام بوكسر عدم تعرض المحصول للإجهاد بسبب بعض العوامل الخارجية كالبرد الشديد او الصقيع أو العطش أو في حالة اصابة التربة بالنيماتودا بنسبة عالية.
- 8- كما هو في مبيدات الاعشاب الاخرى هناك امكانية ظهور بعض نباتات الهيبيان بعد استخدام المبيد بوكسر وذلك في مرحلة متأخرة من نمو وتطور نباتات القمح مع العلم بان هذه الاعشاب ليس لها أي أثر اقتصادي على المحصول حيث ليس لها تأثير على تطور ونمو نباتات القمح وذلك بسبب انباتها في مرحلة متأخرة وعدم قدرتها على المنافسة مع المحصول



## انواع الحشائش المستهدفة



البسلة الشيطاني



الجعضيض



الحميض



الزربح



الحنديق



الخبيزة



الهيان / الزمير

## طريقة الاستخدام والجرعات :-

المحصول	الاعشاب	معدل الاستخدام	طريقة الاستخدام
القمح و الشعير والبطاطس	الاعشاب رفيعة الاوراق مثل الهيبان الحساس و المقاوم	4 لتر / هكتار	يستخدم بعد الزراعة وقبل الانبات بعد الرية الاولى او الثانية على أن تكون التربة في درجة الاستحراث وينتظر مدة 24 ساعة بعد المعاملة وقبل البدء بالرية التالية .
	الاعشاب عريضة الاوراق مثل الخبيزة ، الزربخ ، عرف الديك	3-4 لتر / هكتار	

## توصيات الاستخدام :

- خلطه بالخران أمر سهل ولا يمكن أن يتسبب في انسداد المعدات .
- بالنسبة لعمليات الخلط مع العناصر الكيميائية الأخرى ينصح بإجراء تجربة مصغرة قبل استخدامه على نطاق موسع .
- تجنب الرش في الظروف السيئة مثل اشتداد اشعة الشمس - درجات الحرارة المرتفعة .

## العبوات :

بوكسرمتاح في جالونات سعة 5 لتر .

