

بلتانول

50 % إس إل

الحل الأمثل
لمكافحة الامراض الفطرية والبكتيرية



المادة الفعالة :-

شينسول 50 % إس إل (Chinosol 50% SL)

الوصف :-

مبيد فطري و بكتيري جهازى قوى على هيئة مركز قابل للذوبان في الماء. يستخدم في علاج الامراض الفطرية مثل الفيوزاريوم و الرايزوكتونيا و الفرطيسيليوم و البيثيوم و الفيتوفثورا التي تصيب الجهاز الوعائى في محاصيل الخضر.



استخدامات مبيد بلتانول :-

- مبيد فطري و بكتيري جهازي قوى لمكافحة الامراض التي تصيب الجهاز الوعائى .
- يستخدم عن طريق الرش الورقي بمعدل 1.5 لتر : 2 لتر / 1000 ماء .
- يستخدم عن طريق الحقن بالسمادة بمعدل 2 لتر / هكتار اى ما يساوى 1 لتر / 10 بيت محمى مساحة 500 م² .
- معاملة الشتلات في المشتل عن طريق السقاية او تغطيس الصواني بمعدل 500 مللى / 200 لتر ماء
- يتم سقاية الشتلات في الارض المستديمة خلال 1 : 2 يوم من تاريخ النقل بحد ادنى بمعدل 500 مللى / 200 لتر ماء وذلك داخل البيوت المحمية او الصالات المكيفة ، ثم تكرر المعاملة بعد 10 : 15 يوم من السقاية الاولى لضمان مكافحة امراض الفيوزاريوم والبثيوم والعفن البكتيري والحصول على جذور قوية خالية من الامراض .
- المبيد ذو تاثير فريد على مرض العفن الطرى في البطاطس ، المسبب له بكتريا اروينيا كارتوفورا
- المبيد اعطى نتائج فعالة عند استخدامه في محاور الخضار المكشوف و بخاصة البطاطس بمعدل 1.5 - 2 لتر / هكتار لمكافحة فطر الرايزوكتونيا سولاني .
- يفضل استخدام مبيد بلتانول في المراحل الاولى من نمو النباتات (وقائيا و علاجيا) .

انواع الفطريات والبكتيريا التي يكافحها البلتانول :-

النوع	الاسم العربي	الاسم الانجليزي
الفطريات	العفن الرمادي	Gray Mold
	ذبول الفيوزاريوم	Safflower wilt
	عفن المونيليا	frosty pod rot
	موت البادرات	Root rot, damping off
	البثيوم	Pythium
	الفيتوفثورا	Damping off - Phytophthora
	الفيرتسيليوم	Verticillium Wilt
البكتيريا	عفن الحبوب البكتيري	bacterial grain rot
	بكتيريا التقرح في الطماطم	bacterial canker of tomato
	بكتيريا العفن الطرى في البطاطس	soft rot and blackleg in potato
	الذبول البكتيري في البطاطس	bacterial wilt of potato
	العفن الاسود	black rot
	بكتيريا تقرح الحمضيات	citrus canker


صور الاصابات علي المحاصيل المختلفة



الذبول البكتيري في البطاطس



بكتيريا العفن الطري في البطاطس



مرض ذبول البادرات



العفن الرمادي في الطماطم



بكتيريا التقرح في الطماطم



بكتيريا تقرح الحمضيات



عفن الحبوب البكتيري



ذبول الفيرتسيليوم في الطماطم



مميزات استخدام بلتانول :-

- مبيد فطري و بكتيري جهازى ذو تركيبة فريدة و طريقة عمل متميزة .
- يكافح مدى واسع من الفطريات و البكتريا من النادر ان تجتمع في مبيد واحد .
- له مدى واسع من الاستخدام على العديد من المحاصيل الحقلية و الخضروات .
- مكافحة طويلة الأمد ، فاعلية سريعة .
- انخفاض فترة ما قبل الحصاد هي (7 أيام) .
- أمن على البيئة و الحشرات النافعة و متوافق مع برامج مكافحة متكاملة

توصيات الاستخدام :-

- يراعى عدم خلطة مع المركبات القلوية .
- يفضل استخدامه في المراحل الاولى من عمر النباتات .
- يحفظ المبيد في مكان امن بعيدا عن مصادر الحرارة و الرطوبة و ضوء الشمس المباشر .

معدل الأستخدام والجرعات :-

المحصول	المسببات المرضية ومعدل الاستخدام	فترة التحريم
الخضروات (طماطم - خيار - فلفل - كوسة - بطيخ - شمام - باذنجان - زهرة - ملفوف - الخ)	الرايزوكتونيا - الفيوزاريوم - الفيرتيسيليوم - البيثيوم	3 يوم
المحاصيل الحقلية	الرايزوكتونيا - الفيوزاريوم - الفيرتيسيليوم - البيثيوم	14 يوم
المشاتل	الذبول الناتج من الفيوزاريوم والبيثيوم	-
نباتات الزينة	الذبول الناتج من الفيوزاريوم والبيثيوم	-
الحمضيات	الرايزوكتونيا - الفيوزاريوم - الفيرتيسيليوم - البيثيوم	7 يوم
اشجار الفاكهة	الفيتوفثورا	7 يوم

العبوات :

بلتانول متاح في عبوات سعة 1 لتر